



Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP n° 235, de 13/07/2016
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

CONCURSO PÚBLICO PARA FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS EDITAL 24/2019

ORIENTADOR DE ESTÁGIO DE MEDICINA VETERINÁRIA

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

- Este caderno contém 50 questões.
- Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Assinale, no local correspondente da folha definitiva de respostas, sua opção de resposta com caneta azul ou preta.
- A duração máxima da prova é de três horas.
- O candidato não poderá levar o caderno de questões.
- É proibido qualquer tipo de consulta.
- O candidato, no decorrer da prova, só poderá sair da sala acompanhado de um dos fiscais.

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Inscr.: _____ Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas:

- (A) aeródromo, crisântemo, idólatra, âmago .
- (B) anátema, refém, cânon, cáfila.
- (C) êxodo, harém, édito, fíbula.
- (D) látex, acórdão, aloés, álcool.
- (E) vândalo, critérios, próprio, prosódia.

2. Assinale o uso correto do hífen:

- (A) anti-social, contra-senso, mini-saia, ante-projeto
- (B) auto-aprendizagem, co-autor, extra-escolar, semi-aberto.
- (C) anti-histórico, macro-história, micro-ondas, inter-racial.
- (D) micro-computador, pseudo-professor, ultra-moderno, geo-política.
- (E) micro-sistema, inter-estadual, super-interessante, ultra-som.

3. Em cada uma das seguintes sequencias de palavras, há uma que está escrita incorretamente, assinale-a:

- (A) cento, pressa, observação, natureza.
- (B) desaparecer, versos, posição, profecia.
- (C) conversação, absurdo, prolixidade, aspereza.
- (D) benção, surdez, possibilidade, exclusiva.
- (E) esdrúchulo, vasamento, excessão, quizer.

4. Assinale qual alternativa apresenta substantivos terminados em -ão, que podem ter dois e até três plurais:

- (A) irmão, chão, alemão, pão.
- (B) aldeão, ancião, ermitão, guardião.
- (C) cão, escrivão, mão, catalão.
- (D) tabelião, cidadão, pagão, caminhão.
- (E) barracão, visão, ilusão, doação.

5. Marque qual alternativa completa as frases corretamente:

Sou a que chora sem saber _____.

Contavam fatos da vida, incidentes perigosos _____ tinham passado.

_____ não me deixa em paz?

Eu sem você não tenho _____.

- (A) porque, porquê, por quê, por que.
- (B) por quê, por que, por que, porquê.
- (C) porquê, porque, porquê, por quê.
- (D) por que, porque, por quê, por que.
- (E) porque, por quê, por que, porquê.

6. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da crase:

- (A) Falou à qualquer pessoa.
- (B) Ali vai a mulher à quem disseste a notícia.
- (C) Quando estiveram face à face ficaram mudos.
- (D) Fui à cidade.
- (E) Irei à casa logo mais.

7. Em qual alternativa apresenta o uso da oração coordenada aditiva:

- (A) Quando a cólera ou o amor nos visita, a razão se despede.
- (B) Acabou-se o tempo das ressurreições, mas continua o das insurreições.
- (C) Ele e, portanto, seu filho são responsáveis pela denúncia.
- (D) Remetemos dois convites ao Paulo, mas ou ele se mudou ou está doente.
- (E) A pobreza e a preguiça andam sempre em companhia.

8. Quanto o uso de mal e mau, assinale a alternativa que completa, corretamente, a sua utilização:

_____ a equipe entrou em quadra foi delirantemente aplaudida.

Quando a previsão diz tempo bom, isso é _____.

Para se trilhar o caminho do _____ é indispensável não se importar com o congestionamento. (Fraga – humorista)

- (A) mal, mau, mal.
- (B) mau, mau, mal.

- (C) mal, mau, mau.
 (D) mal, mal, mau.
 (E) mau, mau, mau.

9. Assinale a alternativa que apresenta, apenas, pronomes demonstrativos:

- (A) meu, tuas, lhe, vossa alteza.
 (B) vossa senhoria, eles, minhas, os.
 (C) aquilo, isso, este, aquela.
 (D) ela, essa, minha, tuas.
 (E) vossa, isso, seus, teus.

10. Tendo como base a charge publicada em 2010, na Revista Veja, responda:



Fonte da figura: Revista Veja. Disponível em : <http://www.betinaetrich.ntr.br/2010/07/obesidade-infantil.html>

I – uma crítica quanto a temática obesidade infantil em diferentes fases da vida da criança;

II – o excesso de açúcar na alimentação das crianças acarreta sérios danos à saúde, entre eles, a obesidade infantil;

III – a Organização Mundial da Saúde (OMS) impõe aos líderes mundiais que elevem, imediatamente, os impostos sobre de refrigerantes e sucos.

Assinale as alternativa correta:

- (A) I e II estão corretas;
 (B) apenas a I está correta;
 (C) apenas a II está correta;
 (D) II e III estão corretas.
 (E) todas estão corretas.

MATEMÁTICA

11. Para uma pesquisa sobre “redes sociais” uma instituição de ensino superior entrevistou aleatoriamente 40 estudantes. Dos entrevistados, 12 cursam Ciência da Computação, 10 fazem Administração, 14 são alunos de Direito e 8 cursam simultaneamente Administração e Direito, e o restante são alunos de Medicina Veterinária. Então, o número de estudantes entrevistados que cursam Medicina Veterinária é:

- (A) 04
 (B) 12
 (C) 08
 (D) 10
 (E) 05

12. Em um tanque há uma população de 10000 alevinos de pacu, ao atingir um determinado tamanho é necessário trocá-los de tanque, estima-se que o número de elementos com comprimento maior ou igual a x cm seja dado, aproximadamente pela expressão $\frac{10000}{x^2+1}$. Pode-se concluir que o número aproximado de alevinos com comprimento entre 3 cm e 7 cm é igual a:

- (A) 1.000
 (B) 200
 (C) 1.200
 (D) 800
 (E) 400

13. Dado o sistema de equações $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 18 \\ x - y = -3 \end{cases}$, o conjunto solução de pares ordenados que o satisfaz, são:

- (A) $S = \{ (0,3) \text{ e } (4,1) \}$
 (B) $S = \{ (0,3) \text{ e } (1,-4) \}$
 (C) $S = \{ (0,-3) \text{ e } (-4,1) \}$
 (D) $S = \{ (0,3) \text{ e } (-4,-1) \}$
 (E) $S = \{ (0,-3) \text{ e } (-1,4) \}$

14. Uma empresa fará um treinamento envolvendo 200 funcionários. Os funcionários

serão distribuídos em três grupos proporcionais ao número de monitores disponível. Sabendo que há 10 monitores para efetuar o treinamento e estes foram distribuídos na proporção 3,5 e 2, então, cada grupo terá respectivamente:

- (A) 40, 60 e 100 funcionários;
- (B) 100, 80 e 20 funcionários;
- (C) 60, 100 e 40 funcionários;
- (D) 80, 100 e 20 funcionários;
- (E) 20, 80 e 100 funcionários;

15. Um prêmio no valor de 620 reais foi dividido entre os três funcionários destaques do mês de junho, a divisão foi feita de forma inversamente proporcionais aos seus salários. Carlos recebe 5 salários mínimos, Lucas recebe 2 salários mínimos e Douglas recebe 3 salários mínimos, sendo assim, Carlos, Lucas e Douglas receberam respectivamente a quantia de:

- (A) R\$ 120,00; R\$ 300 e R\$ 200,00
- (B) R\$ 120,00; R\$ 200 e R\$ 300,00
- (C) R\$ 300,00; R\$ 200 e R\$ 120,00
- (D) R\$ 320,00; R\$ 100 e R\$ 200,00
- (E) R\$ 100,00; R\$ 320 e R\$ 200,00

16. No setor de gomas de uma fábrica de balas, 16 funcionários produzem 240 balas de morango por dia, trabalhando 8 horas diárias. Quantos funcionários, com a mesma qualificação dos primeiros, conseguiriam produzir 600 balas de morango por dia, trabalhando 10 horas diárias?

- (A) 50
- (B) 30
- (C) 25
- (D) 18
- (E) 32

17. Para inaugurar mais uma de suas franquias, João precisou fazer um empréstimo no valor de R\$ 25 000,00. Após pagar as 20 parcelas do empréstimo ele verificou que tinha pago um total de R\$ 49 000,00. Diante destas condições, a taxa de juros mensal cobrada pelo prestador foi:

- (A) 1,2%
- (B) 4%
- (C) 6%
- (D) 2,4%
- (E) 4,8%

18. Um terreno retangular tem 128m de perímetro. Sabendo que seu comprimento tem 20m a mais que sua largura, então seu comprimento, largura e área, são respectivamente:

- (A) 42m, 22m e 924m²
- (B) 22m, 42m e 924m²
- (C) 52m, 32m e 1664m²
- (D) 32m, 52m e 1664m²
- (E) 32m, 32m e 1024m²

19. Qual é a razão $\frac{y}{x}$, quando consideramos o sistema de equações:
$$\begin{cases} \frac{x-2}{3} + \frac{y}{2} = \frac{1}{2} \\ x - \frac{y-1}{2} = 2 \end{cases}$$

- (A) 0,05
- (B) 0,5
- (C) 2
- (D) 0,2
- (E) 5

20. Na agência de carros importados "VESTCAR", o aluguel de um determinado carro custa R\$280,00 por dia, acrescido de R\$3,00 por quilômetro rodado. Na agência de carros importados "CARVEST", o mesmo modelo custa R\$400,00 por dia, acrescido de um real por quilômetro. Quantos quilômetros devem ser rodados para que o valor do aluguel seja igual em ambas às agências, considerando o aluguel por um dia?

- (A) 72 km
- (B) 70 km
- (C) 68 km
- (D) 60 km
- (E) 64 km

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Durante a anamnese é importante questionar o proprietário sobre medicações administradas ao paciente recentemente ou de uso contínuo, sobre esse tema, assinale a alternativa **correta**:

- (A) Nenhuma medicação de uso esporádico ou contínuo interfere no protocolo anestésico;
- (B) Betabloqueadores não tem efeito aditivo aos agentes inalatórios ou venosos utilizados como anestésicos;
- (C) A cimetidina inibe o metabolismo de drogas dependentes de biotransformação pelo citocromo P-450, como é o caso do tiopental;
- (D) Os antibióticos podem ser administrados sem preocupação, uma vez que não interferem nos fármacos de uso anestésico;
- (E) O fenobarbital não causa alteração nas enzimas hepáticas.

22. A avaliação física e exames complementares são de extrema importância na preparação anestésica de um paciente, sobre isso, assinale a alternativa **correta**:

- (A) O peso do paciente é indiferente, uma vez que, a utilização de dose é definida para adultos e filhotes;
- (B) A desnutrição pode levar a hipoproteïnemia e aumentar a quantidade de fração livre de fármacos de ligação à proteínas;
- (C) Filhotes de cães e gatos não necessitam de exames complementares como hemograma e bioquímicos, já que são pacientes saudáveis;
- (D) Exames complementares de imagem, como ultrassonografia em cadelas suspeitas de piometra raramente são solicitados;
- (E) Eletrocardiografia deve ser requisitada para todos os pacientes, indiferente idade e histórico.

23. Sobre medicações pré-anestésicas (MPA), assinale a alternativa **correta**:

- (A) São utilizados como tranquilizantes: fenotiazínicos e butirofenonas como a acepromazina e a detomidina respectivamente;
- (B) Temos como exemplo de anticolinérgicos o glicopirrolato, a atropina e o diazepam;
- (C) Os opióides são rotineiramente empregados e temos como exemplo a morfina e a metadona;
- (D) São exemplos de benzodiazepínicos: diazepam e dexmedetomidina;
- (E) São exemplos de agonistas α_2 -adrenérgicos: atropina, dexmedetomidina e xilazina

24. Sobre a utilização de xilazina, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) Esse fármaco frequentemente causa vômito em cães e gatos;
- (B) A utilização desse fármaco em baixas doses e associado a opióides como o butorfanol e tramadol diminui os efeitos adversos;
- (C) A associação de xilazina a cetamina é amplamente empregada e uma das opções de protocolo anestésico com menores efeitos colaterais;
- (D) Em geral, utiliza-se a dose de 0,1 a 1mg/kg desse fármaco em pequenos animais;
- (E) A xilazina administrada intravenosa causa diminuição da frequência cardíaca e elevação transitória da pressão arterial.

25. Os anestésicos dissociativos causam efeitos importantes sob os sistemas nervoso central, cardiovascular e respiratório, sobre isso, assinale a alternativa **correta**:

- (A) A cetamina causa aumento na pressão intracraniana;
- (B) A cetamina pode ser utilizada isolada, uma vez que tem baixa estimulação do sistema nervoso central;
- (C) Esses fármacos não causam aumento da frequência cardíaca, mas aumentam a pressão arterial;
- (D) A cetamina não causa hipersalivação, diferentemente da morfina;

(E) A tiletamina causa alteração no ritmo respiratório, levando ao aumento da taxa de dióxido de carbono e do pH sanguíneo.

26. A Anestesia Geral Intravenosa tem por objetivo conferir:

- (A) Relaxamento muscular, inconsciência e hipnose;
- (B) Hipnose, analgesia e coma;
- (C) Relaxamento muscular, coma e incontinência;
- (D) Hipnose, relaxamento muscular e analgesia;
- (E) Hipnose, analgesia e estupor.

27. Assinale a alternativa **incorreta** relacionada ao Índice de Depuração:

- (A) É uma das variáveis a ser considerada na escolha de fármacos para a anestesia geral intravenosa;
- (B) Também chamada de *Clearance*;
- (C) A depuração de distribuição (Cl_D), transfere o fármaco do compartimento central para os periféricos, tornando-o disponível temporariamente para a depuração sistêmica.
- (D) O fígado é o principal órgão responsável pela depuração sistêmica de fármacos;
- (E) A depuração é a capacidade do organismo de retirar o fármaco de forma definitiva do sangue ou plasma.

28. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a frase a seguir. "A meia-vida de eliminação é o tempo necessário para que a quantidade total do fármaco ministrado seja reduzido a _____".

- (A) 75%
- (B) 60%
- (C) 40%
- (D) 90%
- (E) 50%

29. São exemplos de anestésicos inalatórios:

- (A) Isoflurano e Propofol;
- (B) Halotano e Desflurano;

- (C) Sevoflurano e Cetamina;
- (D) Isoflurano e Halotano;
- (E) Etomidato e Isoflurano.

30. Ainda sobre os anestésicos inalatórios, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) São os fármacos de escolha em pacientes debilitados ou geriátricos na maioria dos casos;
- (B) O Halotano causa redução na contratilidade cardíaca;
- (C) O Isoflurano pode causar hipertensão pela redução de resistência vascular periférica;
- (D) Parte do Sevoflurano sofre biotransformação, resultando em fluoretos inorgânicos que são rapidamente excretados pela urina;
- (E) O Isoflurano reduz o débito cardíaco pelo aumento da frequência cardíaca.

31. Para diagnóstico de gestação precoce de cadelas é possível utilizar exames de palpação ou de imagem como a ultrassonografia, que são indicados entre:

- (A) 20 a 25 dias de gestação;
- (B) 15 a 30 dias de gestação;
- (C) 45 a 60 dias de gestação;
- (D) 24 a 30 dias de gestação;
- (E) 10 a 20 dias de gestação.

32. A placenta de cadelas e gatas são diferentes morfológicamente das outras espécies, sendo portanto classificadas como:

- (A) Epiteliocorial;
- (B) Endoteliocorial;
- (C) Hemocorial;
- (D) Sindesmocorial;
- (E) Cotiledonária;

33. O esforço excessivo durante o parto pode acarretar em prolapso uterino, acerca desse tema, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) A utilização de açúcar para diminuir o edema do tecido prolapsado é comum, na tentativa de reduzir manualmente o útero;
- (B) A limpeza do tecido exteriorizado com solução salina, ou água aquecida é aconselhável;
- (C) A amputação do tecido uterino não é uma opção, uma vez que existe extensa vascularização envolvida;
- (D) Deve-se tomar o cuidado para lubrificar a massa exteriorizada, evitando possíveis lesões de manipulação;
- (E) A castração dessa fêmea é recomendada, já que distocia e infertilidade são comuns após episódio de prolapso uterino.

34. A gestação de cadelas e gatas tem duração aproximada de:

- (A) 50 e 70 dias respectivamente;
- (B) 45 e 60 dias respectivamente;
- (C) 63 e 65 dias respectivamente;
- (D) 70 e 30 dias respectivamente;
- (E) 66 e 40 dias respectivamente.

35. Considerando a fisiologia do parto de cadelas, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) Nas últimas 8 a 24 horas antes do início do parto, ocorre o aumento do cortisol fetal;
- (B) Os níveis de progesterona na fêmea aumentam nos últimos 30 dias de gestação;
- (C) A prolactina aumenta nos últimos dias antes do parto;
- (D) A relaxina atua sobre o miométrio;
- (E) A concentração de estrógeno decai 2 dias antes do parto.

36. As fases do parto são classificadas respectivamente em:

- (A) Fase de expulsão do produto, Fase de dilatação da via fetal, Fase prodrômica;
- (B) Fase prodrômica, Fase de contração da vulva, Fase de expulsão dos envoltórios fetais;

- (C) Fase de expulsão dos envoltórios fetais, Fase de dilatação da via fetal, Fase prodrômica;
- (D) Fase de dilatação da via fetal, Fase prodrômica, Fase de insinuação da vulva.
- (E) Fase prodrômica, Fase de dilatação da via fetal, Fase de expulsão do produto.

37. Sobre a distocia, avalie as sentenças e assinale a alternativa **correta**:

- I- Pode decorrer de fatores maternos como a inércia uterina e anomalias do canal pélvico;
- II- Pode decorrer de fatores fetais como o tamanho excessivo e mau posicionamento;
- III- Pode decorrer de fatores externos, como barulho e presença de outros animais;
- IV- Pode decorrer de fatores fetais como a inércia uterina e mau posicionamento.

- (A) Apenas I esta correta;
- (B) I e II estão corretas;
- (C) I, II e III estão corretas;
- (D) I, II e IV estão corretas;
- (E) Todas estão corretas.

38. Ainda sobre distocia, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) A intervenção por manipulação manual em cadelas é possível em fêmeas de grande porte, mas dificultada em cadelas pequenas;
- (B) A intervenção medicamentosa é comum, sendo frequentemente utilizada a ocitocina e o gluconato de cálcio;
- (C) A intervenção cirúrgica é uma opção de tratamento;
- (D) Nenhum protocolo anestésico prejudica a viabilidade fetal em situações de intervenção cirúrgica;
- (E) A inércia uterina é causada por fatores fetais.

39. Considerando o tratamento de feridas, assinale a alternativa **correta** sobre a utilização de drenos:

- (A) Os drenos podem ser classificados em passivos, ativos ou mistos;
- (B) Algumas das indicações para utilização de drenos são: higromas em cotovelo, hematoma aural e abscesso;
- (C) Utiliza-se vácuo na drenagem passiva;
- (D) Os drenos chatos são exemplos de drenos do tipo ativo;
- (E) O tempo de utilização da drenagem é variável e seu uso não oferece riscos, podendo dessa forma, ser mantido por tempo indeterminado.

40. Sobre o tratamento de feridas, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) O desbridamento é a retirada de tecido necrosado da ferida e pode ser feito de forma cirúrgica, enzimática, biocirúrgica, entre outras;
- (B) O mel é utilizado no tratamento de feridas pelo seu efeito antibacteriano, baixo pH e hipertonicidade;
- (C) As soluções de limpeza anti-sépticas são indicadas em feridas limpas e contaminadas, uma vez que eliminam bactérias e destroem células inviáveis;
- (D) É necessária a avaliação da viabilidade tecidual, considerando fatores como a cor da pele, calor, sensibilidade à dor e sangramento;
- (E) O Tempo de Preenchimento Capilar (TPC) diminuído junto à cor escura do tecido, são indicativos de inviabilidade da pele.

41. A mastectomia em pequenos animais é uma técnica cirúrgica comumente empregada. Sobre o tema assinale a alternativa **correta**:

- (A) A lumpectomia é a retirada do tumor com grande área mamária circundante;
- (B) A mastectomia regional é um procedimento cirúrgico simples, que objetiva a retirada de todas os grupos de glândulas mamárias unilateralmente;
- (C) O carcinoma inflamatório mamário felino deve ser tratado cirurgicamente para remoção completa dos tecidos afetados;

- (D) A mastectomia bilateral completa simultânea tem por objetivo retirar ambas as cadeias mamárias, tecidos interpostos e linfonodos regionais;
- (E) Quando necessária a retirada da glândula inguinal, pode-se fazer isso de forma despreocupada, pois não há irrigação sanguínea local.

42. Sobre as cirurgias gástricas, assinale a alternativa **correta**:

- (A) A gastrotomia é retirada de parte do estômago;
- (B) Inicia-se a incisão do estômago por estocada e posteriormente aumenta-se a abertura com tesoura;
- (C) Não é necessária a remoção do conteúdo gástrico durante as cirurgias de estômago;
- (D) Comumente utiliza-se um único padrão de sutura incorporando as camadas mucosa e muscular;
- (E) Se feita de forma asséptica, não é necessária a utilização de antibioticoterapia em cirurgias gástricas.

43. A orquiectomia em cães e gatos é um procedimento frequente nos clínicas e hospitais veterinários, sobre essa técnica assinale a alternativa **correta**:

- (A) Comumente em cães, a incisão é feita na linha média ventral do prepúcio na base do escroto, enquanto nos gatos, faz-se incisão sobre cada testículo separadamente;
- (B) Em gatos não faz-se necessária a utilização de anestesia para orquiectomia, uma vez que essa espécie é mais resistente a dor;
- (C) A orquiectomia pode ser do tipo "aberta" ou "fechada", sendo a primeira caracterizada pelo pinçamento, ligadura e seccionamento do cordão espermático mantendo a túnica do processo vaginal intacta, enquanto a segunda caracteriza-se pela exposição das estruturas internas do cordão espermático incisando o processo vaginal. As técnicas são feitas para animais acima de 20kg e até 20kg respectivamente;

- (D) Castração aberta não necessita de sutura de pele, enquanto castração fechada sim;
- (E) As estruturas anatômicas do cordão espermático são: artéria testicular, veia vaginal, plexo pampiniforme, vasos linfáticos, duto deferente e plexo testicular.

44. Assinale a alternativa **incorreta** relacionada ao criptorquidismo:

- (A) Testículos retidos em cavidade podem resultar em alterações malignas como o seminoma ou sertolioma em cães mais velhos;
- (B) A descida dos testículos deve ocorrer logo após o nascimento, sendo considerado criptorquida, o paciente a partir de dois meses de idade sem as gônadas no escroto;
- (C) Os machos criptorquidas unilateralmente possuem disfunção na libido, prejudicando a reprodução;
- (D) O criptorquidismo canino é transmitido de maneira recessiva autossômica simples;
- (E) O testículo em cavidade abdominal é menor em tamanho quando comparado ao descido.

45. Com relação a castração de fêmeas, assinale a alternativa **correta**:

- (A) A preparação da pele incluindo remoção dos pelos e antissepsia para castração de fêmeas deve ser feita apenas no local da incisão, ou seja, 4 a 8cm imediatamente caudal ao umbigo;
- (B) Tanto em cadelas quanto em gatas, a incisão é realizada na mesma altura abdominal, ou seja, cranial ao umbigo;
- (C) Ovariectomia é a retirada dos ovários e cornos uterinos;
- (D) Em gatas é aconselhável realizar a incisão no terço médio do abdome caudal devido a localização do corpo uterino;
- (E) A castração de fêmeas só pode ser feita depois dois 18 meses de idade tanto em cães quanto em gatos, devido a imaturidade sexual.

46. Sobre a anatomia do trato reprodutivo de fêmeas, assinale a alternativa que preenche **corretamente** a afirmativa "Os ovários, ovidutos e útero de cadelas são presos às paredes dorsolaterais da cavidade abdominal e à parede lateral da cavidade pélvica pelos ligamentos _____ direito e esquerdo. Cranialmente ele se prende através do _____".

- (A) suspensor – músculo largo do ovário;
- (B) largos – músculo oblíquo;
- (C) laterais – ligamento largo do ovário;
- (D) largos – ligamento suspensor do ovário;
- (E) suspensor – músculo abdominal ventral.

47. Assinale a alternativa **correta**:

- (A) O útero é composto por três camadas distintas: túnica serosa (perimétrio), túnica muscular (miométrio) e túnica mucosa (endométrio);
- (B) A túnica serosa contém vasos sanguíneos, nervos e fibras musculares oblíquas;
- (C) A túnica muscular é uma camada de peritônio que recobre todo o útero;
- (D) A túnica mucosa é composta por uma camada externa longitudinal fina e uma camada interior grossa;
- (E) A túnica serosa tem a maior força tênsil.

48. Sobre a técnica cirúrgica de cesariana, assinale a alternativa **correta**:

- (A) Não é recomendada a exteriorização do útero gravídico;
- (B) O útero gravídico é rígido e por isso a incisão é realizada aplicando-se mais força;
- (C) Após a incisão na face dorsal ou ventral do corpo uterino, faz-se a retirada dos fetos cuidadosamente;
- (D) Os neonatos não necessitam de muitos cuidados, uma vez que realizada a secção dos vasos umbilicais resultam em movimentos respiratórios imediatos;
- (E) A incisão do útero gravídico pode ser feita em qualquer região sem preocupação com vasos sanguíneos.

49. Com relação a conduta terapêutica de hérnias, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) A localização das hérnias abdominais é uma das formas de classificação, sendo, ventral, pré-púbica, subcostal, paracostal, lateral ou hipocondral;
- (B) As hérnias abdominais ocorrem com maior frequência por traumas automobilísticos e posteriormente por lesões congênitas;
- (C) A realização de exames de imagem como radiografias e ultrassonografia são dispensáveis em pacientes com hérnias, uma vez que sempre é necessária a intervenção cirúrgica e não acrescentam informações relevantes ao tratamento e prognóstico;
- (D) Hérnias umbilicais podem ser resolvidas espontaneamente em animais jovens;
- (E) Hérnias abdominais externas são defeitos na parede externa do abdome.

50. Na correção cirúrgica de hérnica paracostal, os músculos a serem suturados são:

- (A) Oblíquo externo do abdome, longíssimo e linha alba;
- (B) Transverso, serrátil ventral e linha alba;
- (C) Oblíquo interno do abdome, longíssimo e serrátil ventral;
- (D) Transverso, serrátil dorsal cranial e longíssimo;
- (E) Transverso, oblíquo interno do abdome e oblíquo externo do abdome.

